


Ορολογικός έλεγχος της HBV λοίμωξης



Τάκης Αποστολόπουλος © 2004

Διαφοροδιάγνωση της ιογενούς ηπατίτιδας Β

Ορολογικοί δείκτες HBV	Διαγνωστικές προσεγγίσεις									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
HBsAg	-	+	+	+	+	+	-	-	-	-
Anti-HBs ή HBsAb	-	-	-	-	-	-	+	+	-	+
Anti-Hbc IgM ή HBc Ab IgM	-	-	+	-	+	-	-	-	-	-
Anti-Hbc ή HBc Ab	-	-	+	+	+	+	+	+	+	-
HBeAg	-	+	+	+	-	-	-	-	-	-
Anti-HBe ή HBe Ab	-	-	-	-	+	+	+	-	-	-

Ερμηνεία αποτελεσμάτων

1. Επίνοσος, συνιστάται εμβολιασμός
2. Περίοδος επώασης ή πρόσφατη οξεία HBV λοίμωξη
3. Οξεία HBV λοίμωξη
4. Χρόνια HBV λοίμωξη
5. Οξεία HBV λοίμωξη που βρίσκεται στην περίοδο "του παράθυρου"
6. Επιμένουσα HBV λοίμωξη-φορέας. Η μολυσματικότητα ή μη του φορέα εξαρτάται από την θετικότητα ή μη του HBV DNA
7. Οροαναστροφή της οξείας HBV λοίμωξης με ανοσία χωρίς κλινική αποθεραπεία
8. Φυσική ανοσία όχι επανέλεγχος - εμβολιασμός
9. i) Ψευδοθετικό αποτέλεσμα ii) Εξασθενημένη φυσική ανοσία από παλαιά ιαθείσα HBV λοίμωξη, συνοδευόμενη από χαμηλό, μη ανιχνεύσιμο τίτλο anti-HBs, iii) Οξεία HBV λοίμωξη στην περίοδο "του παράθυρου" κατά την εξαφάνιση του HBsAg και με καθυστερημένη εμφάνιση του anti-HBs, iv) Χρόνια λοίμωξη με χαμηλή, μη ανιχνεύσιμη συγκέντρωση HBsAg, ή ότι το HBsAg βρίσκεται εγκλωβισμένο σε κάποιο ανοσοσύμπλεγμα.
10. Ανοσία μετά από εμβολιασμό